

**PARTE II**  
**AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

---

26. O auxiliar de enfermagem, ao realizar uma injeção intradérmica (ID), deve introduzir a agulha, seguindo um ângulo de
- A) 90°.
  - B) 45°.
  - C) 25°.
  - D) 15°.
27. O quadrante da região glútea, que deve ser usado ao se fazer uma injeção intramuscular, é o
- A) inferior interno.
  - B) inferior externo.
  - C) superior externo.
  - D) superior interno.
28. A insulina deve ser administrada por via
- A) subcutânea.
  - B) endovenosa.
  - C) intramuscular.
  - D) oral.
29. São doenças que podem ser prevenidas por vacina:
- A) sarampo, raiva e diabetes.
  - B) sarampo, tétano, e AIDS.
  - C) coqueluche, sarampo e tétano.
  - D) coqueluche, sarampo e dengue.
30. A frequência normal da respiração no adulto varia de
- A) 16 a 20 vezes por minuto.
  - B) 20 a 25 vezes por minuto.
  - C) 25 a 30 vezes por minuto.
  - D) 30 a 40 vezes por minuto.
31. Taquifigmia é o termo usado para definir o pulso
- A) lento.
  - B) ausente.
  - C) rápido.
  - D) irregular.
32. Um dos sinais que caracteriza a insuficiência respiratória é a
- A) cianose.
  - B) febre.
  - C) tosse cheia.
  - D) tosse seca.
33. A posição que o auxiliar de enfermagem deve orientar a parturiente, para uma melhor evolução do trabalho de parto e oxigenação do feto, é
- A) decúbito dorsal.
  - B) decúbito lateral.
  - C) posição de Fowler.
  - D) posição horizontal.
34. A posição usada para parto, operações ou exame de períneo, vagina, bexiga e reto é
- A) a genupeitoral.
  - B) a ginecológica.
  - C) a litotômica.
  - D) a de Fowler.
35. A infecção intestinal grave, caracterizada por diarreia insidiosa, aquosa, incoercível, por vômitos, desidratação súbita, acidose e choque hipovolêmico, é a
- A) dengue.
  - B) varicela.
  - C) tuberculose.
  - D) cólera.
36. De acordo com a lei do exercício da enfermagem, são atividades do auxiliar de enfermagem:
- A) fazer consulta e diagnósticos de enfermagem.
  - B) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
  - C) dirigir os serviços e participar da programação de enfermagem.
  - D) planejar, organizar, coordenar e avaliar os serviços de enfermagem.
37. A frequência cardíaca do adulto é geralmente aferida pela palpação da
- A) veia pediosa.
  - B) artéria temporal.
  - C) veia basílica.
  - D) artéria radial.

38. O método de o auxiliar de enfermagem alimentar o paciente por meio de uma sonda nasogástrica é denominado
- A) alimentação enteral.
  - B) alimentação venosa.
  - C) alimentação parenteral.
  - D) alimentação por gavagem.
39. O processo de limpeza da pele para administração de uma medicação por via endovenosa denomina-se
- A) degermação.
  - B) desinfecção.
  - C) anti-sepsia.
  - D) assepsia.
40. O método utilizado pela enfermagem para realizar o banho em paciente acamado é denominado
- A) banho de aspersão.
  - B) banho no leito.
  - C) banho de chuveiro.
  - D) banho rápido.
41. A introdução de líquido na cavidade gástrica, seguida de sua remoção por meio de uma sondagem, denomina-se
- A) lavagem intestinal.
  - B) enteroclise.
  - C) lavagem gástrica.
  - D) clister.
42. Uma das finalidades das aplicações frias é
- A) relaxar a musculatura.
  - B) aumentar a circulação no local da aplicação.
  - C) estancar a hemorragia.
  - D) fluidificar os exsudatos.
43. O auxiliar de enfermagem, ao realizar curativos, deve
- A) começar pelos mais infectados (sépticos) e fazer os limpos (assépticos) por último.
  - B) começar pelos mais limpos (assépticos) e fazer os infectados (sépticos) por último.
  - C) conversar com o paciente enquanto manipula o material que usará para fazer o curativo.
  - D) limpar o carrinho com solução desinfetante apenas depois do uso.
44. Assinale a alternativa que contém o desconforto que será evitado, ao se aquecer as soluções para lavagem intestinal.
- A) Vômitos.
  - B) Disenteria.
  - C) Flatulência.
  - D) Cólicas.
45. Para prevenir escaras, a assistência de enfermagem deve incluir, sistematicamente,
- A) administração de medicação anti-coagulante, higiene corporal e aeração do ambiente.
  - B) mudança de decúbito, fricção da pele com álcool e aeração do ambiente.
  - C) higiene corporal, mudança de decúbito e massagem das áreas corporais sob grande pressão.
  - D) mudança de decúbito, fricção da pele com álcool e aumento da ingestão de líquidos.
46. São cuidados prestados pelo auxiliar de enfermagem no pós-operatório imediato:
- A) observar o estado de consciência, posicionar o paciente com a cabeça "lateralizada" e o pescoço distendido para evitar aspiração nos casos de vômito.
  - B) observar e anotar a aceitação da dieta, posicionar o paciente com a cabeça "lateralizada" e o pescoço distendido para evitar aspiração nos casos de vômito.
  - C) solicitar ao paciente que inspire profundamente, ajudar na higiene corporal e oferecer líquidos por via oral de 2/2 horas.
  - D) observar e anotar a aceitação da dieta, ajudar na higiene corporal e oferecer líquidos por via oral de 2/2 horas.
47. São cuidados prestados pelo auxiliar de enfermagem a pacientes com hemorragia de estômago após procedimento cirúrgico:
- A) colocar o paciente sentado e inclinar a cabeça para trás.
  - B) fazer tamponamento anal e colocar o paciente sentado.
  - C) colocar bolsa de gelo sobre o estômago do paciente e elevar seus membros inferiores.
  - D) colocar bolsa de gelo na região supra-púbica do paciente e colocá-lo sentado.

48. O melhor meio para prevenir a diarreia no recém-nascido é o(a)
- A) aleitamento materno.
  - B) imunização.
  - C) saneamento adequado.
  - D) higiene pessoal.
49. Uma medida sanitária para prevenção do controle da dengue é o(a)
- A) eliminação do vetor.
  - B) isolamento do doente.
  - C) controle do comunicante.
  - D) tratamento dos infectados.
50. O volume máximo a ser introduzido no músculo deltóide não deve ultrapassar
- A) 2 ml.
  - B) 4 ml.
  - C) 8 ml.
  - D) 10 ml.